



이제  
개선된 보험  
보장 범위 및  
기타 절약 범위가 있  
습니다



## 만성 가스, 복통 또는 설사로 고생하시나요?

PANCREAZE는 충분한 소화 효소를 만들 수 없는 췌장 때문에 음식을 정상적으로 소화할 수 없는 사람들을 치료하는 데 도움이 됩니다. 외분비 췌장 기능 부전(Exocrine Pancreatic Insufficiency, EPI) 1기, 2기의 상황입니다. 이 브로슈어에서 설명을 확인하세요:

- EPI와 그 증상은 무엇입니까?
- PANCREAZE는 무엇입니까?
- PANCREAZE 복용 방법

### 중요 안전 정보

**PANCREAZE에 대해 알아야 할 가장 중요한 정보는 무엇입니까?**

PANCREAZE는 수술이 필요할 수도 있는 섬유화결장병이라 불리는 심각하고 희귀한 대장 질환을 증가시킬 가능성을 높일 수 있습니다. 이 질환의 위험은 의료 서비스 제공자가 제공한 투약 지침을 따름으로써 줄어 들 수 있습니다.

**PANCREAZE 가이드와 동봉된 전체 처방 정보를 읽어보십시오.**



증상 관리 방법을 소개합니다

## 삶의 순간 순간을 방해하는 EPI 증상이 있으신가요?

PANCREAZE는 증상 제어에 도움을 드립니다. 그로서 진정으로 중요한 것에 집중할 수 있게 됩니다. PANCREAZE가 자신에게 맞는지 의사에게 물어보세요.

### 중요 안전 정보

의사가 처방한 대로 **PANCREAZE**를 정확하게 섭취하세요. 의사의 지시보다 더 많거나 적은 **PANCREAZE**를 섭취하지 마세요.

특이하거나 심한 배 부분(복부) 통증, 팽만감, 배설 문제 (배변 활동), 미식거림, 구토, 또는 설사 증상이 있는 경우 즉시 의사에게 연락하세요.

약물 치료 가이드와 동봉된 전체 처방 정보를 읽어보세요.



오늘 등록하세요:

**PANCREAZEengage.com**

할인 혜택  
보기




### 지시

PANCREAZE는 낭포성 섬유증 등으로 췌장에서 효소가 충분히 만들어지지 않아 음식을 정상적으로 소화하지 못하는 사람들을 치료하기 위해 사용하는 처방약입니다. PANCREAZE는 몸이 음식의 지방, 단백질 및 당분을 소모할 수 있도록 도와줍니다.

## 외분비 췌장 기능

외분비 췌장 기능 부전(EPI)은 췌장이 음식을 소화하는데 필요한 효소, 특히 지방을 소화하는데 필요한 효소인 췌장 리파아제를 분비할 수 없을 때 발생하는 질환입니다. 이 질환은 췌장의 세포 손상으로 인한 질환입니다.<sup>2</sup>



### 소화 시스템

위  
췌장  
크고 작은 내장

EPI를 가진 사람들은 주요 췌장 효소가 부족하고, 지방, 단백질, 그리고 탄수화물을 적절히 소화하고 흡수할 수 없습니다.<sup>2</sup>

### EPI를 가진 환자는 다음과 같은 증상을 겪게 됩니다:

- 소화 불량: 음식물을 몸에 좋은 영양소로 분해할 수 없음
- 흡수 불량: 해당 영양소를 흡수할 수 없음

#### 중요 안전 정보

**PANCREAZE**를 복용하기 전에 의사에게 무엇을 알려야 할까요?

다음과 같은 경우 의사에게 알려주세요:

- 돼지고기(돼지) 제품에 알레르기가 있는 경우
- 장폐색 병력이 있거나 장벽에 상처나 결핵(섬유화결장병)이 있는 경우
- 통풍, 신장병, 고혈 요산(고혈증)이 있는 경우

## 부전 알아보기

### EPI 발병의 가장 일반적인 원인<sup>3</sup>

1

낭포성 섬유증 (CF)은 유전 질환입니다. 미국에 있는 대략 30,000명의 사람들에게 영향을 미칩니다.<sup>4</sup> CF 환자 중 대략 66%가 외분비 췌장 기능 부전을 태어난 후 얼마 지나지 않아 갖게 됩니다. 이 확률은 1년마다 85%로 증가합니다.<sup>5</sup>

2

만성 췌장염 (CP)은 EPI의 주요 원인입니다. 췌장 세포 손상으로 인해 췌장은 음식으로부터 영양분을 흡수하는데 필요한 소화 효소를 제공하지 못하게 됩니다. 이 질환은 진행성이며 나중에 성인(일반적으로 30-40세 사이)에 진단됩니다. CP의 가장 흔한 이유는 알코올 섭취와 관련이 있습니다.<sup>6,7</sup>

3

EPI는 환자 병력, 증상 및 특정 실험실 검사 결과를 같이 보고 나서 진단됩니다. **EPI**와 관련된 것으로 보이는 그 밖의 요인은 다음과 같습니다: 제1형 및 제2형 당뇨병, 과민성 창자 질환, 체강 질환(치료 불가능한) 췌장암 및 췌장 절제술.<sup>6</sup>

#### 중요 안전 정보


**PANCREAZE**를 복용하기 전에 의사에게 무엇을 알려야 할까요?

다음과 같은 경우 의사에게 알려주세요:

- 캡슐을 삼키는 데 문제가 있는 경우
- 다른 질병이 있는 경우
- 임신 중이거나 임신 계획 중
- 모유 수유 중이거나 모유 수유 계획

약물 치료 가이드와 동봉된 전체 처방 정보를 읽어보세요.





증상 관리 방법을 소개합니다<sup>SM</sup>

## EPI의 증상

EPI 환자들은 하나 이상의 만성 위장 문제 및 위장 문제를 겪습니다. EPI의 증상은 다른 소화 관련 질환과 유사할 수 있습니다. 그래서 진단하기가 어렵습니다.<sup>6</sup>

지연된 치료는 전반적인 건강과 삶의 질에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 중 하나 이상의 만성 증상이 있는 경우 의사와 상의하세요:



설사, 가스, 팽만감, 복통, 기름기 있는 배변, 설명할 수 없는 체중 감소<sup>6</sup>

### 중요 안전 정보

처방전 및 비처방 의약품, 비타민, 및 약초 보충제 등 복용하는 모든 의약품에 대해 의사에게 알려주세요.

## EPI 환자에 대한 최근 온라인 설문 조사에서:

**59%**

환자들 중 59%는 그들은 EPI 진단을 받기 전에 **2명 이상의 의사를 만나야 했었다고** 보고했습니다.

**58%**

환자들 중 58%는 **EPI로 진단되기 까지 1년에서 2년 이상** 걸린다고 밝혔습니다.

**Top 3**

환자들이 보고한 가장 고질적인 증상들: **가스, 복통 및 설사**

온라인 환자 설문조사: 2020년 11월부터 2021년 1월까지 Qualtrics가 실시한 온라인 설문조사. 외분비 췌장 기능 부전(EPI) 진단을 받고 PERT 치료제인 CREON, PERTZYE, PANCREAZE, ZENPEP, VIOKACE 중 하나를 사용한 18세 이상 101명의 환자로 부터 응답입니다. 응답자들은 설문 조사에 참여한 것에 대한 보수를 받았습니다.

### 중요 안전 정보

**PANCREAZE의 부작용은 무엇입니까?**

PANCREAZE는 다음과 같은 심각한 부작용을 일으킬 수 있습니다:

- 섬유화결장병이라 부르는 드문 창자 장애
- 입 안의 자극. PANCREAZE를 완전히 다 삼키지 않으면 발생할 수 있습니다
- 호흡 곤란, 피부 발진 등의 알레르기 반응 또는 입술 붓기

약물 치료 가이드와 동봉된 전체 처방 정보를 읽어보세요.





## PANCREAZE는 무엇입니까?

### PANCREAZE는 췌장 효소 대체 치료 방법입니다!

PANCREAZE는 귀하 또는 귀하의 자녀분이 가지고 있는 효소를 대체하는 처방약입니다 소화하지 못하는 사람들에게 처방됩니다.

PANCREAZE에는 리파제, 프로테아제 및 아밀라제를 포함한 소화 효소의 혼합물이 포함되어 있습니다. PANCREAZE의 효소는 신체가 음식을 적절하게 소화하고 지방, 단백질 및 탄수화물을 흡수하도록 돕습니다. 이는 건강한 성장, 체중 증가 및 영양 건강 개선에 필요합니다.

**PANCREAZE는 복통과 같은 EPI 증상을 개선하는 것으로 임상적으로 입증되었습니다 팽만감, 설사, 기름진 변.<sup>8</sup>**

#### 중요 안전 정보

**PANCREAZE의 부작용은 무엇입니까?**

PANCREAZE는 다음과 같은 심각한 부작용을 일으킬 수 있습니다:

- 혈액 요산 수치가 증가할 수도 있습니다. 이로 인해 동봉된 전체 혈액 요산 수치의 증가로 일어날 수 있습니다



1

PANCREAZE는 캡슐 형태로 되어 있습니다. 내부에는 효소를 함유한 작은 '구슬'들이 여러개 들어 있습니다!

2

각 비드는 특수 장용 코팅으로 덮여 있습니다. 캡슐이 소장에 들어가면 pH가 코팅을 촉발하여 음식을 소화하는 데 도움이 되는 효소를 용해 및 방출합니다!

참고: 그림에는 실제 캡슐 색상과 내용이 표시되지 않습니다.

#### 중요 안전 정보

PANCREAZE는 다음과 같은 심각한 부작용을 일으킬 수 있습니다:

- PANCREAZE와 다른 췌장 효소 제품들은 사람들이 돼지고기로 먹는 것과 같은 돼지들의 췌장으로 만듭니다. 이 돼지는 바이러스를 옮길 수 있습니다. 보고된 적은 없지만, 돼지에서 나온 췌장 효소 제품을 복용함으로써 바이러스에 감염될 수 있습니다.

약물 치료 가이드와 동봉된 전체 처방 정보를 읽어보세요.



# PANCREAZE 복용하기

**PANCREAZE는 6가지 강도로 제공되며, 각 환자의 맞는 필요에 따라 유연하게 복용할 수 있습니다<sup>1</sup>**

의사는 나이, 체중 및 증상에 따라 복용량을 환자 개인에게 맞춥니다. PANCREAZE의 유연한 용량 옵션을 통해 귀하에게 맞는 용량을 복용할 수 있습니다.

**PANCREAZE 강도**  
(리파제 단위)

2,600 4,200 10,500 16,800 21,000 37,000

0.705" 캡슐은 상대 크기로 표시됩니다

필요한 경우 체장 효소를 얻을 수 있도록 의사가 캡슐의 복용량 및 언제 섭취하는지 알려줄 것입니다

## 중요 안전 정보

가장 흔한 부작용으로는 위통(복부 통증)과 가스가 포함됩니다. PANCREAZE의 모든 부작용이 다 나와 있지 않습니다. 괴롭거나 사라지지 않는 부작용에 대해 의사와 상의하세요. 다음 연락처로 FDA에 부작용을 보고할 수 있습니다: 1-800-FDA-1088 또는 [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch). 또한 VIVUS LLC.에 1-888-998-4887로 부작용을 보고할 수 있습니다.

## PANCREAZE 때 끼니와 간식과 함께 복용해야 합니다<sup>1</sup>

효과적인 용량 및 방법은 환자에 따라 다릅니다. 담당 의사가 PANCREAZE 복용 방법에 대해 조언해 줄 것입니다. 즉, 복용량이 한 번에 전부일 수도 있고 식사하는 동안 나누어질 수도 있습니다. 늘 의사가 권장하는 대로 PANCREAZE를 정확하게 복용하세요.

일부 환자의 경우 식사 과정에서 복용량을 나누는 것이 효과적인 소화를 위한 최적의 방법일 수 있습니다.<sup>5</sup>



**시작:** 식사 시작 시 캡슐 1개 또는 그 이상의 캡슐을 섭취

**계속:** 식사 중에 캡슐 1개 또는 그 이상의 캡슐을 섭취

**완료:** 식사가 끝나면 캡슐 1개 또는 그 이상의 캡슐을 섭취

## 중요 안전 정보

**PANCREAZE는 어떻게 복용해야 하나요?**

PANCREAZE 캡슐이나 내용물을 으깨거나 찢지 마시고 캡슐이나 내용물을 입에 물고 있으면 안 됩니다. 정확하게 의사의 처방대로 PANCREAZE를 복용해야 합니다. 성인과 어린이(12개월 이상 어린이)를 위한 PANCREAZE 복용 방법에 대한 지침이 나와 있는 약물 가이드를 읽어보세요.

약물 치료 가이드와 동봉된 전체 처방 정보를 읽어보세요.



# PANCREAZE 복용하기

## PANCREAZE를 제대로 복용해야 합니다

### 12개월 이상 어린이와 성인용의 경우



식사 또는 간식과 **충분한 수분과 함께** PANCREAZE를 복용하세요. 하루에 많은 양의 식사나 간식을 섭취하는 경우 1일 총 섭취량을 초과하지 않도록 주의하십시오.



캡슐 또는 그 내용물을 부수거나 씹거나 캡슐 또는 내용물을 입에 물지 마십시오. PANCREAZE 캡슐을 부수거나 씹거나 입에 물고 있으면 입안에 자극이 가해지거나 PANCREAZE가 신체에서 작용하는 방식이 바뀔 수 있습니다.

### 유아 간병인용 (12개월까지의 유아)

조제분유나 모유를 먹이기 직전에 약을 **먹이세요**



조제분유나 모유와 **직접 섞지 마세요.**

### 중요 안전 정보

#### PANCREAZE는 어떻게 복용해야 하나요?

유아(12개월까지의 유아)에게 PANCREAZE를 복용시키는 방법에 대한 지침에 대한 약물 가이드를 읽어 보세요.

## 캡슐을 삼킬 수 없으신가요?

캡슐을 삼킬 수 없는 경우 내용물을 산미가 있는 음식에 뿌려서 복용해도 좋습니다 (예: 사과 소스, 오렌지 주스, 으깬 블루베리).

약을 완전히 삼킨 후 즉시 물을 마시거나 주스를 마시세요.



참고: 그림의 캡슐은 실제 크기가 아니며 정확한 크기나 색상을 나타내지 않습니다.



PANCREAZE에 대해 자주 묻는 질문 및 자세한 내용을 보려면 다음 사이트를 방문하세요:

**PANCREAZE.com**

참조: **1.** PANCREAZE 전체 처방 정보. Campbell, CA: VIVUS LLC; 2021. **2.** Pezilli R, et al. Exocrine pancreatic insufficiency in adults: A shared position statement of the Italian association for the study of the pancreas. *World J Gastroenterol.* 2013;19(44):7930-7946. **3.** Lindkvist B. Diagnosis and treatment of pancreatic exocrine insufficiency. *World J Gastroenterol.* 2013;19(42):7258-7266. **4.** The Cystic Fibrosis Foundation (n.d.). About Cystic Fibrosis. 검색 출처: <https://www.cff.org/What-is-CF/About-Cystic-Fibrosis/> **5.** Struyvenberg MR, et al. Practical guide to exocrine pancreatic insufficiency - breaking the myths. *BMC Med.* 2017;15(1):29. **6.** Othman MO, et al. Introduction and practical approach to exocrine pancreatic insufficiency for the practicing clinician. *Int J Clin Pract.* .2018;72:e13066. **7.** The National Pancreas Foundation (n.d.). About Chronic Pancreatitis. Retrieved from <https://pancreasfoundation.org/patient-information/chronic-pancreatitis/> **8.** Trapnell BC, et al. Efficacy and safety of PANCREAZE<sup>®</sup> for treatment of exocrine pancreatic insufficiency due to cystic fibrosis. *J Cyst Fibros.* 2011;10(5):350-356

약물 치료 가이드와 동봉된 전체 처방 정보를 읽어보세요.





## PANCREAZE가 자신에게 맞는 지 의사에게 물어보세요.

- 복통, 붓기, 설사, 기름진 변과 같은 만성 EPI 증상을 개선하는 것이 임상적으로 입증되었습니다.<sup>8</sup>
- 6가지 용량으로 제공되는 PANCREAZE의 다양한 투약 옵션으로 각 환자 개인의 요구에 맞는 맞춤 복용을 보장합니다.<sup>1</sup>
- 여러 보관 방법들! 내부 커버의 내용을 참조하십시오.

### 중요 안전 정보

가장 흔한 부작용으로는 위통(복부 통증)과 가스가 포함됩니다.

모두 PANCREAZE의 부작용입니다. 괴롭거나 사라지지 않는 부작용에 대해 의사와 상의하세요. 부작용 신고:

FDA 1-800-FDA-1088 또는

[www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch). 부작용 신고:

VIVUS LLC, 1-888-998-4887로 전화.

©2022 VIVUS LLC. 관련 소유.  
500167.03-D-USP 02/2022

